

Composietenfamilie

Groep 4: Buis- en lintbloemen, pappus bestaat uit haren, Bloemhoofdjesbodern zonder stroschubben

- [-] Lintbloemen wit, rood, paars of lila
 - [-] Lintbloemen breder dan 1,2 mm, meestal in 1 rij
 - Zulte - *Aster tripolium*
 - Smalle aster - *Aster lanceolatus*
 - [-] Lintbloemen tot 1,2mm, vaak in meer dan 1 rij
 - [-] Meer lint- dan buisbloemen
 - Canadese fijnstraal - *Conyza canadensis*
 - Hoge fijnstraal - *Conyza sumatrensis*
 - Gevlamde fijnstraal - *Conyza bonariensis*
 - [-] Minder lint- dan buisbloemen
 - Scherpe fijnstraal - *Erigeron acer*
 - Muurfijnstraal - *Erigeron karvinskianus*
 - Zomerfijnstraal - *Erigeron annuus*
- [-] Lintbloemen geel
 - [-] Omwindselblaadjes in 1 rij, of de binnenste in 1 rij en de buitenste veel klein
 - Moerasandijvie - *Tephrosia palustris*
 - Klein hoefblad - *Tussilago farfara*
 - [-] Jacobskruid - *Jacobaea* ; aantal binnenste omwindselblaadjes gelijk aan
 - Moeraskruiskruid - *Jacobaea paludosa*;
 - Viltig kruiskruid - *Jacobaea erucifolia*; omwindselblad zonder zwarte t
 - Waterkruiskruid - *Jacobaea aquatica*; zeer grote eindslip aan blad
 - Jacobskruiskruid - *Jacobaea vulgaris*
 - [-] Kruiskruid-Senecio ; aantal binnenste omwindselblaadjes tot 2x zoveel a
 - [-] Bladeren gezaagd of getand, niet diep ingesneden
 - Bezemkruiskruid - *Senecio inaequidens*
 - Rivierkruiskruid - *Senecio sarracenicus/Senecio fluviatilis*
 - Schaduwkruiskruid - *Senecio nemorensis/Senecio ovatus*
 - [-] Bladeren bochtig, veerspletig tot veerdelig
 - Oostelijk kruiskruid - *Senecio vernalis*
 - Boskruiskruid - *Senecio sylvaticus*
 - Kleverig kruiskruid - *Senecio viscosus*

